

**Анализ движения
пациентов с первично
выявленным раком
гортани**

Позняк В.А.

почта: vera.poznyk@mail.ru

Актуальность

- Злокачественные новообразование гортани занимает лидирующую позицию среди опухолей ЛОР- органов.
- Заболеваемость раком гортани растет с каждым годом (с 5,5 на 100 тыс. населения в 2000 г до 7,3- в 2019 г.).
- Современные данные, показывают, что злокачественные новообразования не образуются в здоровых тканях, им предшествуют патологические изменения, которые провоцируются действием неблагоприятных факторов: табакокурение, злоупотребление алкоголем.



Цель

- Оценить движение пациентов с первично выявленным раком гортани от их обращение в поликлинику до постановки диагноза.

Методы исследования

- Анализ производился на основании данных пациентов с раком гортани, находившихся в оториноларингологическом отделении УЗ «Гродненская университетская клиника» с августа 2022 года по январь 2023, с помощью статистической таблицы в Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждения.


- Аналізу подвергнуты 13 человек.

Интересовали :

- место жительство,
- возраст,
- семейное положение,
- вредные привычки (курение, алкоголь),
- сколько прошло времени от появления до обращения,
- какие жалобы были,
- лечился ли до обращения,
- куда и какому врачу обратился,
- сколько времени обследовался по месту жительства,
- была ли выполнена биопсия, компьютерная томография (КТ),
- через сколько после направления приехал в лечебное учреждение,
- как была выполнена биопсия,
- через сколько получен результат гистологического исследования,
- сколько времени находился в отделении.

Результаты и их обсуждения.

- Все исследуемые были мужчинами, из которых 76,9% (10 чел.) трудоспособного возраста.
- 46,2% лица сельского населения, 53,9% - городские жители, женаты 84,6% (11 чел.).




Результаты и их обсуждения.

- Лишь трое из всех, оказались не курящими.
- Подавляющее количество, 92,3% не лечилось, только один-принимал противовоспалительные препараты.
- Все пациенты попали на прием к врачу-оториноларингологу в городской поликлинике и центральную районную больницу.



Результаты и их обсуждения.

- 30,8% пациентов обратились с боль в горле, 30,8% - с охриплостью, 38,5% - с комплексом симптомов (болью, охриплость, одышкой).
- Обследование по месту жительства прошли до месяца. Троим (23,1%) была выполнена биопсия, но не был получен однозначный результат. Большинству (76,9% (10 чел.)) была выполнена КТ до поступления.



Результаты и их обсуждения.

- Все пациенты поступили в отделение через 1 месяц по бюро госпитализации.
- 7,7% (1 чел.) была выполнена биопсия в день поступления, 69,2%(9 чел.) – на следующий день под местной анестезией, 23,1% (3 чел.) - была выполнена прямая ларингоскопия с биопсией.
- Результат гистологического исследования большинству пациентов (61,5%) был получен через 4 дня.
- Четверым понадобилось выполнения КТ с контрастированием для уточнения распространения процесса.

Результаты и их обсуждения.

- В стационаре 23,08% пациентов находилось до 5 дней, 30,8% -10-15 дней, 7,7%-15-20 дней, 23,1%- больше 20 дней.
- Длительность пребывания зависела от того через сколько был получен результат гистологического исследования, какое лечение показано пациенту(оперативное, химиотерапия, лучевая терапия).



Выводы

- Раком гортани болеют чаще мужчины трудоспособного возраста, курящие.
- Чаще наблюдается комплекс симптомов (38,5%) при обращении.
- Длительность периода от направления пациента из медицинского учреждения по месту жительства до госпитализации составила в среднем 1 месяц.
- Малому количеству пациентов (23,1%) выполняется биопсия по месту жительства.
- Большинству (69,2%) выполняется биопсия под местной анестезией, средняя продолжительность ожидания результата гистологического исследования 4 дня.

Список используемой литературы.

- И. Д. Шляга, Ж. В. Колядич, С. А. Иванов, А. А. Евмененко
Эпидемиологический анализ злокачественных новообразований
гортани в Беларуси за 2000–2019 гг. // Проблемы здоровья и
экологии. – 2021
- Абызов Р. А. Лоронкология / пер. с укр. СПб.: Диалог, 2004. 256 с.
- Пачес А. И. Опухоли головы и шеи. М.: Практическая медицина,
2013. 478 с.

Благодарю д.м.н., профессора Хорова О.Г.
за идею исследования и помощь в работе